


קולונוסקופיה באסותא רעננה – פרופ' דורון בולטין

דווח מזכירות גסטרו באסותא רעננה (רח' החרושת 14)

חצי שעה לפני מועד הפעולה. חובה להגיע עם מלווה, הפנייה ות"ז. אסור לנהוג במשך 12 שעות אחרי הבדיקה.



לקראת הבדיקה:

- אין להפסיק אספירין לפני הבדיקה. יש להתיעץ עם רופא הגסטרו/משפחה לגבי הפסקת תרופות מדללי דם אחרות
- יש להתיעץ עם רופא המשפחה האם להפסיק תרופות לסכרת ביום שלפני הבדיקה
- **אם אתה סובל מעצירות** עליך לקחת תרופה משלשלת (עצירות/ביסקודיל/לקסדין, פגלקס או נורמלקס) החל מהיום החמישי לפני הבדיקה

3 ימים לפני הבדיקה:

- **אסור לאכול** : פירות וירקות, קטניות (שעועית, חמוס, אפונה, עדשים, פול, תירס) ודגנים מלאים המכילים סיבים (לחם חי/ חיטה מלאה, שיבולת שועל, דגני בוקר, גרנולה)
- **מותר לאכול**: לחם לבן או פיתה מקמח לבן, פסטה, אורז לבן, עוף, דגים, הודו, מרק עוף, מוצרי חלב (שלא מכילים פירות)

24 שעות לפני הבדיקה

מותר לאכול ארוחה קלה ולאחר מכן **אסור לאכול בכלל**. יש לעבור לנוזלים צלולים (שקופים) כגון מיצים מסוננים, תה, מרק צח

שתית מרוקן ולקסדין:

<p>למטופלים העוברים את הבדיקה אחרי 12:30</p> <p>יום לפני הבדיקה בשעה 20:00 2 טבליות עצירות/ביסקודיל/לקסדין ולשתות 1500 מ"ל מרוקן תוך 90 דקות (כוס כל 5 דקות)</p> <p>בבוקר הבדיקה, 6 שעות לפני מועד הקולונוסקופיה 2 טבליות עצירות/ביסקודיל/לקסדין ולשתות 1500 מ"ל מרוקן תוך 90 דקות (כוס כל 5 דקות)</p>	<p>למטופלים העוברים את הבדיקה בשעות הבוקר : 08:00 – 12:30</p> <p>יום לפני הבדיקה בשעה 14:00 2 טבליות עצירות/ביסקודיל/לקסדין ולשתות 1500 מ"ל מרוקן תוך 90 דקות (כוס כל 5 דקות)</p> <p>יום לפני הבדיקה אחרי השעה 20:00 2 טבליות עצירות/ביסקודיל/לקסדין ולשתות 1500 מ"ל מרוקן תוך 90 דקות (כוס כל 5 דקות)</p>
---	---

חלופה לבחירתך - מנה הראשונה של מרוקן ועצירות/ביסקודיל/לקסדין לשתות 11 שעות לפני מועד הבדיקה, ואת המנה השנייה של מרוקן ועצירות/ביסקודיל/לקסדין לשתות 6 שעות לפני מועד הבדיקה (ישפר את איכות הקולונוסקופיה אבל יפגע באיכות השינה בלילה...)

החל משעתיים לפני הבדיקה - צום מוחלט

אם תצטרך לבטל את התור נא להודיע לשר"פ+ לפחות **שבועיים מראש**